


INTOXICACION POR EL HONGO DE LA PRADERA (1)



QUE ES?

ES UNA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR UN HONGO QUE AFECTA GRAVEMENTE AL HIGADO DE LOS ANIMALES, PRODUCIENDO SIGNIFICATIVOS DAÑOS SANITARIOS Y ECONOMICOS.



LESION DE FOTOSENSIBILIZACION EN PARTES BLANCAS DE ANIMALES INTOXICADOS.


(1) Tomado de: División Productores y Relaciones Cooperativas.

Extensión Veterinaria, Conaprole.

CUANDO SE PRESENTA?

- 1) CLIMA CALIDO Y HUMEDO.
- 2) PRESENCIA ABUNDANTE DE PASTO MUERTO EN LAS CAPAS INFERIORES DE LAS PRADERAS DONDE NO LLEGA EL SOL.

TEMPERATURAS ALTAS. HUMEDAD Y ABUNDANTE MATERIA MUERTA FAVORECEN EL DESARROLLO DEL HONGO QUE AL REPRODUCIRSE FORMA ESPORAS EN DONDE SE ENCUENTRA EL TOXICO (Veneno). Ver Revisitas N° 134 y N° 137.



COMO SE PRESENTA?

SINTOMAS:

- **NERVIOSISMO:** Animales inquietos, se mueven constantemente.
- **GRAN MERMA DE LA PRODUCCION LACTEA.**
- **DOLOR ABDOMINAL.** Se patean el vientre.
- **COLOR MORADO DE UBRE.**
Enrojecimiento y desprendimiento de piel.
- **ORINA OSCURA.**
- **CONSTIPACION.** Materias fecales duras.
- **FOTOSENSIBILIZACION EN PARTES BLANCAS.** Desprendimiento del cuero.
- Coloración **AMARILLA** en **OJO** y **VULVA**.



COMO PREVENIR:

- REALIZANDO UN BUEN MANEJO DE LA PRADERA EN PRIMAVERA PASTOREANDO EN FRANJAS CON ALAMBRE ELECTRICO.
- CUANDO SE CORTA EL FORRAJE, Y POR RAZONES CLIMATICAS NO PUEDE ENFADARSE, SE DEBE RETIRAR EL PASTO CORTADO Y ELIMINARLO DE LA PRADERA.

EVITE QUE LA PRADERA TENGA PASTO MUERTO.

EN CASO DE SOSPECHA O DUDA SOBRE LA PELIGROSIDAD DE LA PRADERA, CONSULTE CON LOS TECNICOS DE LA REGIONAL DE SU ZONA.

TRATAMIENTO:

DEBERÁ SER SINTOMÁTICO O SEA PROTEGER

EL ÓRGANO PRINCIPALMENTE AFECTADO: EL HÍGADO, CON PROTECTORES HEPÁTICOS, ANTI-HELMÍNTICOS Y ANTIBIOTICOS.

LOS MEDICAMENTOS MÁS CONOCIDOS EN PLAZA SERÍAN:

VETALOG INYECTABLE: 3 CC INTRAMUSCULAR.

DEXAMETAZONA S.E.: HASTA 10 CC INYECTABLE SUBCUTÁNEO O INTRAMUSCULAR (NO INYECTAR A VACAS PREÑADAS).

DIFRAN INYECTABLE: 1 CC POR CADA 100 KGS. DE PESO, DOS VECES POR DÍA.

SEDOCOL: 3-4 CUCHARADAS SOPERAS DILUIDAS EN AGUA.

METHIVERTAN: 100 CC INYECTABLE SUBCUTÁNEO O INTRAVENOSO.

ADEMÁS SUERO GLUCOSADO Y CALCIO.